

## 欧洲卒中量表

评分标准	治疗前	溶栓后	治疗 21 天后
意识水平：10=清醒；8=嗜睡；6=反复刺激或疼痛刺激才有反应；4=对疼痛刺激有躲避或防御反应；2=对疼痛刺激有产生去大脑强直；0=对疼痛刺激无任何反应			
理解力：给口头指令，不要示范：伸舌，指鼻，闭眼。 8=完成 3 项；4=完成 1~2 项；0=不能完成			
言语：8=正常；6=基本可以交谈；4=交谈费力；2=只能回答是或不是；0=不能言语 视野：8=正常；0=有缺损			
水平凝视：8=正常；4=眼球正中位，侧视受限；2=眼球侧视位，尚能回到正中位；0=眼球侧视位，不能回到正中位			
下部面肌运动：8=正常；4=轻瘫；0=全瘫			
上肢近端肌（保持 45 度伸直位）：取卧位，闭上双眼，前伸双上肢，双手掌相对，置于中线两侧，双上肢与床面成 45 度，保持 5 秒钟，只评患侧。 4=5 秒；3=秒，但患手内旋；2=不能保持此位置 5 秒，可保持较低位置；1 不能保持此位置，但仍可抗阻力；0=5 秒内掉落床面			
上肢近端肌（抬高 90 度）：取卧位，上肢置于下肢旁，手放中立位，患肢伸直向前抬 90 度。4=正常；3=上肢可伸直，前伸不能达 90 度；2=上肢弯曲，运动不充分，前伸>45 度；1=轻微运动，可抬离床面<45 度；0=不能抬离床面			
伸腕：托起患肢前臂，患手无支托，放松，旋前位。要求病人伸腕。8=正常；6=运动充分，但力弱；4=运动不充分；2=轻微运动，手腕不能伸直；0=腕无背伸运动			
手指屈肌：双手的拇指和食指捏成圆圈，对抗检查者施加的压力。8=与健侧相同，4=力弱，0=拇指和食指不能成一圆圈			
下肢近端肌（闭目，大腿垂直床面，小腿水平位）：4=5 秒；2=小于 5 秒，但仍在床上；1=5 秒内落到床上；0=立刻落到床上			
下肢近端肌（屈髋，屈膝）：仰卧，双腿伸直位。要求屈髋屈膝。4=正常；3=抗阻力，但力弱；2=可抗重力；1=不能抗重力；0=无屈髋屈膝运动			
足背屈：8=正常；6=运动充分，但力弱；4=不充分，腿伸直或半膝弯曲，足外旋；2=轻微运动（肌力 2 级）；0=无踝关节运动			
步行能力：10=正常；8=步态异常或步行速度，距离受限；6=扶拐行走；4=有人扶行；2=不能行走，但可支持下站立；0=不能站立			
总得分			